

BADANIE REZONANSU MAGNETYCZNEGO

UWAGA !!!

DO KAŻDEGO BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO PACJENT POWINIEN MIEĆ AKTUALNY (nie starszy niż 10 dni) POZIOM KREATYNYNY W SUROWICY KRWI !!!

DO BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ:

- dokument tożsamości
- dokumentację medyczną (poprzednie badania obrazowe – CD + opisy, karty informacyjne itp.)
- aktualny wynik kreatyniny w surowicy krwi

PRZYGOTOWANIE DO BADANIE MIEDNICY MNIEJSZEJ:

- dzień przed badaniem należy zażyć 2 saszetki środka przeczyszczającego FORTRANS lub CITRO-FLEET
- przygotować środek przeczyszczający zgodnie z ulotką i zacząć pić o godz. 13:00 i 15:00
- od czasu zażycia środka przeczyszczającego stosować tylko dietę płynną- zaleca się pić dużo wody niegazowanej, co najmniej 1,5 litra
- nie opróżniać pęcherza moczowego bezpośrednio przed badaniem (pęcherz moczowy nie powinien być zupełnie pusty ani nadmiernie wypełniony)
- przed badaniem można zażyć leki popijając je niewielką ilością wody niegazowanej

PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ : jama brzuszna, głowa, szyja, kręgosłup, twarzoczaszka, kończyny dolne i górne, piersi:

- w przeddzień badania wypić co najmniej 1,5 litra niegazowanej wody
- 2-3 godz. przed badaniem nie jeść i nie pić (do badania jamy brzusznej 5 godz.)
- przed badaniem można zażyć leki popijając je niewielką ilością wody niegazowanej
- do badania piersi należy dostarczyć poprzednie badania mammograficzne i usg piersi

BEZWZGLĘDNYM PRZECIWSKAZANIEM do wykonania badania MR jest obecność w ciele metalicznych elementów (np. rozrusznika serca, opiłków metalicznych w oku, wszczepionego aparatu słuchowego, klipsu na naczyniu wewnątrzczaszkowym z materiału z domieszką żelaza itp.)

DODATKOWE INFORMACJE

Należy **ubrać się w miarę przewiewnie** – ubiór powinien być z **tkanin naturalnych**. **Nie są wskazane tkaniny bądź rajstopy z dużą domieszką lycry**, ponieważ powodują zakłócenia i zniekształcenia obrazu.

Nie powinno się przychodzić w makijażu; jeżeli Pacjentki posiadają makijaż permanentny powinny poinformować o tym technika obsługującego MR. Dwa tygodnie przed badaniem nie należy robić trwałej ondulacji; w dniu badania nie stosować lakieru do włosów.