

Przygotowanie do badania endoskopowego (gastroskopia, kolonoskopia)

<https://www.dco.com.pl/endoskopia/>

• PRZYGOTOWANIE DO GASTROSKOPII

Pacjenci przyjmujący leki rozrzedzające krew powinni poinformować lekarza o tym fakcie w dniu ustalania badania endoskopowego.

Przed badaniem endoskopowym należy co najmniej trzy dni wcześniej zaprzestać przyjmowania wyżej wymienionych leków, jeżeli nie jest to możliwe, proszę poinformować wcześniej lekarza wykonującego badanie.

1. W przeddzień badania ostatni posiłek należy spożyć o godzinie 17:00.
2. W dniu badania należy pozostać na czczo (*bez jedzenia i picia*).
3. Przed badaniem obowiązuje rejestracja do gabinetu Endoskopii.

• PRZYGOTOWANIE DO REKTOSKOPII

Pacjenci przyjmujący leki rozrzedzające krew powinni poinformować lekarza o tym fakcie w dniu ustalania badania endoskopowego.

Przed badaniem endoskopowym należy co najmniej trzy dni wcześniej zaprzestać przyjmowania wyżej wymienionych leków, jeżeli nie jest to możliwe, proszę poinformować wcześniej lekarza wykonującego badanie.

Do prawidłowego przygotowania należy zakupić w Aptece 3 szt. Enemy (lewatywy).

1. W przeddzień badania nie spożywamy posiłków, przyjmujemy tylko dowolne płyny.
2. W przeddzień badania o godz. 16:00 i 20:00 wykonujemy lewatywę.
3. W dniu badania, rano wykonujemy również lewatywę.
4. Jeżeli są trudności, przeciwwskazania do wykonania lewatywy, wyżej wymienione przygotowanie można zastąpić metodą przygotowania do kolonoskopii.
5. Należy wypić pełną dawkę preparatu bez modyfikacji.
6. W dniu badania pacjent jest na czczo (*bez jedzenia i picia*).

Przed badaniem obowiązuje rejestracja do gabinetu Endoskopii.

• PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII

Pacjenci przyjmujący leki rozrzedzające krew powinni poinformować lekarza o tym fakcie w dniu ustalania badania endoskopowego.

Przed badaniem endoskopowym należy co najmniej trzy dni wcześniej zaprzestać przyjmowania wyżej wymienionych leków, jeżeli nie jest to możliwe, proszę poinformować wcześniej lekarza wykonującego badanie.

1. W przeddzień badania nie należy spożywać żadnych pokarmów, przyjmujemy tylko płyny (*bez ograniczeń*).
2. Należy wypić specjalny roztwór preparatu przygotowanego wg instrukcji.
3. W żadnym wypadku nie należy modyfikować stężenia roztworu i godzin przyjmowania preparatu.
4. W dniu badania należy pozostać na czczo (*bez jedzenia i picia*).
5. Do przygotowania należy wybrać tylko jeden z niżej proponowanych preparatów.

PREPARATY DO PRZYGOTOWANIA DO KOLONOSKOPII

FORTTRANS

1. W opakowaniu zbiorczym znajdują się 4 saszetki proszku.
2. Do prawidłowego przygotowania należy rozpuścić wszystkie 4 saszetki preparatu wg instrukcji (*1 saszetka w 1 litrze wody*).
3. Całą objętość – 4 litry roztworu Fortransu należy wypić w godzinach 16:00 do 19:00 w dniu poprzedzającym badanie.
4. Przed badaniem obowiązuje rejestracja do gabinetu Endoskopii.

UWAGA!

Nie należy zmniejszać zalecanej ilości płynu do wypicia.

Wyjątek stanowią chorzy w stanie wyniszczenia (waga 30 – 40 kg).

Wówczas należy wypić minimum 3 litry roztworu Fortrans przygotowanego według instrukcji.

Nie przestrzeganie wyżej wymienianych zasad ma bardzo duży wpływ na jakość badania.

UWAGA!